DLP 17-10-91178498

Avertissements agricoles®
ILE DE FRANCE
SPV

ISSN 0767 - 5542

Grandes cultures

BULLETIN N° 678 DU 15 OCTOBRE 1991, ENVOI N° 24

ESCOURGEON	:Traitez les pucerons.
BLE	:Stratégie cicadelles.
COLZA	:Début du vol du Charançon.


ESCOURGEON

■ STADE : levée à 2ème feuille

■ PUCERONS ET JNO :

*Situation :

Le vol des pucerons continue mais est plus faible actuellement et les infestations en culture varient entre 0 et 10% de pieds porteurs de pucerons (ailés + premiers aptères).



Le pouvoir virulifère des pucerons est estimé par des mesures réalisées sur des pots d'orge exposés durant une semaine aux pucerons. Important à la mi-septembre, il baisse actuellement.

semaine d'exposition	% pieds virosés
11 au 18/09	30%
18 au 25/09	11%

* Préconisations :• Intervenir sur les parcelles levées en présence d'au moins 5% de pieds porteurs de pucerons. En absence de pucerons, attendre leur arrivée.
Choix du produit et doses : consulter le dépliant vert.

• Détruire rapidement les repousses, réservoirs de pucerons et de virus.

P106

Ministère de l'Agriculture - D.R.A.F.
Service Régional de la Protection des Végétaux
47, rue Paul Doumer 93100 Montreuil


42 87 76 71

Publication périodique CPPAP n° 536 AD
Imprimerie S.R.P.V.
Directeur Gérant : Myriam HANRION

BLE

▌ STADE : Semis à 1ère feuille.

▌ CICADELLES :

* Situation : Les pièges sont remis en place dans l'Essonne, le sud et le centre Seine et Marne. Les cicadelles Psammotettix volent actuellement et de plus, portent le virus. Il faut donc être très vigilant dans la zone sud de notre région, même si les dégâts ont été limités l'an dernier.

* Préconisation : Les semis précoces sont les plus exposés. Une intervention devra être envisagée assez tôt, au stade une feuille dans la zone sud de la région, avec l'un des cinq produits cités ci-dessous et ayant obtenu une dérogation d'utilisation contre ce ravageur jusqu'au 15 novembre.

Produits (doses pucerons d'automne) :

- DECIS 0,3l/ha
- FASTAC 0,2l/ha
- KARATE 0,15l/ha
- MAVRIK Flo 0,2l/ha
- SUMIALPHA 0,25l/ha

COLZA

▌ STADE = 1 à 7 feuilles

▌ ALTISES : toujours peu de captures dans les cuvettes jaunes - Pas d'intervention.

▌ PUCERONS : Les pucerons cendrés sont assez rares - Par contre les pucerons verts sont toujours bien présents - Intervenez sur jeunes colzas si vous n'avez pas encore traité et si 20% des pieds sont colonisés.

▌ CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL :

* Premières captures en vallée de Seine et dans le Hurepoix.

* Sachez identifier le ravageur :
  - extrémité des pattes rousses, tache blanche sur le dos.
  - tache rousse à la jonction thorax-abdomen.

L'an dernier, ce charançon a causé peu de dégâts car les semis tardifs ont empêché la coïncidence entre le stade "plus de 3 feuilles" et le vol des insectes.

* Un traitement doit être envisagé à partir du 24 octobre dans les secteurs où le charançon a été piégé, à condition que les colzas aient au moins 3 feuilles.
En général, l'intervention doit se situer 8 à 10 jours après les premières captures.

RECTIFICATIF DESHERBAGE ANTI-GRAMINEES (tableau du bulletin précédent)

Stratos est remplacé par Stratos ultra qui s'utilise sans huile à 2l/ha sur graminées annuelles et à 4l/ha sur graminées vivaces.

MILDIOU :

Avec les longues rosées matinales, le mildiou s'est développé. Le nuisibilité de ce champignon est limitée : elle est importante au stade "Cotylédons", elle décroît rapidement par la suite. Le froid bloquera le développement du champignon.
Une intervention ne se justifie pas.

PIEDS SECS :

Sept essais ont été réalisés dans le quart Nord Est de la France à l'automne 1990. Dans la majorité des cas, on observe :

- un fort taux de pieds secs pouvant aller jusqu'à 100% à la récolte
- la présence simultanée de Phome et de Verticillium
- une inefficacité des fongicides à l'automne mesurée sur la réduction du taux de pieds secs ou sur le rendement.

P107